

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative, rue Pélissier, 63034 Clermont Ferrand Cedex

Téléphone (73) 92-42-68 - Poste 477

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL :

70,00 F

Régie de Recettes de la D.D.A.
Sous-Régisseur de Recettes
du Service de la Protection
des Végétaux

Cité Administrative - Rue Pélissier
63034 Clermont Ferrand Cedex
C. C. P. Clermont-Ferrand 5.503-17

N° 193

BULLETIN du 4 JUIN (Edition Générale 1981 - N° 16)

--- ARBRES FRUITIERS A PEPINS ---

TAVELURE du POIRIER et du POMMIER.-

Des contaminations primaires sont toujours possibles.

Il est conseillé d'effectuer un traitement au cours
des premiers jours de la semaine du 9 au 14 Juin.

OÏDIUM du POMMIER.-

Poursuivre la lutte contre cette maladie.

CARPOCAPSE des POMMES et des POIRES.-

Le vol a débuté le 11 Mai.

Les captures deviennent importantes et les premières
pontes ont été déposées vers le 26 Mai en cage d'élevage.

Il y a lieu d'intervenir contre ce ravageur en ajoutant
un insecticide à la bouillie anti-tavelure.

--- ARBRES FRUITIERS A NOYAU ---

MOUCHE de la CERISE.-

Effectuer un traitement sur les variétés tardives au
cours des prochains jours, en utilisant l'un des produits suivants : décaméthrine (DECIS),
diméthoate (nombreuses spécialités), fenthion (LEBAYCID), formothion (ANTHIO FORT),
malathion (nombreuses spécialités), oléoparathion (nombreuses spécialités).

Respecter les délais d'emploi avant récolte.

--- N O Y E U ---

CARPOCAPSE.-

Intervenir contre ce ravageur avant le 12 Juin.

P.1.121

GRANDES CULTURES

BETTERAVES.

Les premiers pucerons sont notés dans quelques parcelles.

La surveillance des cultures doit être effectuée dès à présent, afin de déceler la présence de ces insectes qui sont vecteurs de jaunisse.

Ce contrôle est à réaliser même dans les parcelles ayant reçu au semis, un insecticide systémique dont la rémanence arrive à son terme.

Il est rappelé que le seuil d'intervention est le suivant :

- puceron vert : 1 puceron pour 10 betteraves.
- puceron noir : une colonie pour 2 betteraves.

En cas d'intervention, utiliser les produits suivants : métasystémox, anthonox (0,8 l/ha), kilval, sepaphid (1,25 l/ha), pirimor (500 g/ha).

Si la présence des galeries de la mouche (Pégomyie) est observée en même temps que celle des pucerons, préférer le dipterex MR.

CEREALES.

- Stades phénologiques (selon les dates de semis)

. Blé d'hiver :	10 - 3	(moitié de l'épiaison achevée)
	10 - 5	(tous les épis hors de la gaine)
	10 - 5 - 1	(commencement de la floraison)
	10 - 5 - 2	(floraison complète à la base de l'épi)

- Oïdium

C'est la maladie la plus couramment observée. Certaines parcelles nécessitent une intervention, les dernières feuilles présentant les premiers symptômes.

- Septoriose

A la suite des dernières pluies d'orages, des contaminations ont eu lieu à partir du feuillage de la base : région de COUTANSOUZE, de VARENNES-s/ALLIER, de ST-GERAND-de-VAUX (Allier) et de PAGNANT (Puy-de-Dôme).

La surveillance des cultures doit être encore réalisée de façon à repérer des attaques tardives toujours à craindre.

- Rouille jaune

Un foyer de rouille jaune a été décelé dans la région de BOUDES (Puy-de-Dôme) le 2 Juin sur variété LUTIN.

Il y a donc lieu de surveiller les cultures et d'intervenir dès les premiers foyers. Un traitement peut être réalisé jusqu'à 10 jours après la fleur.

- Pucerons

sur épis.

Les premières colonies sont constatées sur feuilles et

Aucune intervention ne se justifie actuellement.

Le Chef de la Circonscription
Phytoprotectrice,

A. FARGEIX.